



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

Ecricome

Mathématiques

2018

Sujet de mathématiques approfondies

Mathématiques approfondies — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

EXERCICE 1

On note E l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, muni du produit scalaire canonique.

Pour toutes matrices colonnes X et Y de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on note $\langle X, Y \rangle = {}^tXY$.

Pour toute matrice colonne X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on note $\|X\| = \sqrt{{}^tXX}$.

On considère u et v deux endomorphismes de E , et on note A et B leurs matrices respectives dans la base canonique de E .

Partie 1

Soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose dans cette partie uniquement que $n = 2$ et que les matrices de u et v dans la base canonique sont respectivement :

$$A = \frac{1}{1+a^2} \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & a^2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que u et v sont des projecteurs.
2. (a) Vérifier que les endomorphismes u et v sont de rang 1, et que $u \circ v$ est de rang 1 lorsque $a \neq -1$. Déterminer $u \circ v$ lorsque $a = -1$.
(b) Vérifier que le vecteur $x_0 = (1, a)$ est un vecteur propre de $u \circ v$.
(c) Déterminer le spectre de $u \circ v$.
3. (a) Montrer que les valeurs propres de $u \circ v$ appartiennent à l'intervalle $[0, 1]$.
(b) Pour quelle(s) valeur(s) de a , $u \circ v$ est-il un projecteur ?

Partie 2

On revient dans cette partie au cas général, où n désigne un entier tel que $n \geq 2$.

On suppose que u et v sont des projecteurs symétriques de E et on pose : $C = BAB$.

4. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

$$\|BX\|^2 = \langle BX, X \rangle.$$

En déduire que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

$$\|BX\| \leq \|X\|.$$

5. Montrer que C est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

6. Soit λ une valeur propre de C et X un vecteur propre associé.

(a) Exprimer $\|ABX\|^2$ en fonction de λ et $\|X\|$.

(b) En déduire que les valeurs propres de C sont réelles positives.

7. Soit μ une (éventuelle) valeur propre de AB non nulle, et X un vecteur propre associé.

(a) Montrer que BX est un vecteur propre de C . En déduire que μ est strictement positive.

(b) Montrer que : $ABX = \mu AX$. En déduire que : $AX = X$.

(c) Montrer que : $\langle X, BX \rangle = \mu \|X\|^2$.

8. Dédurre des questions précédentes que le spectre de AB est inclus dans $[0, 1]$.

EXERCICE 2

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n,$$

et on note f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2 - 6y.$$

On pose enfin : $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

1. Vérifier que $\varphi > 1$ et que les réels φ et $\frac{-1}{\varphi}$ sont les solutions de l'équation :
- $$x^2 - x - 1 = 0.$$

2. (a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

(b) Montrer que les seuls points critiques de f sont $(\varphi, \varphi + 1)$ et $\left(-\frac{1}{\varphi}, \frac{1}{\varphi + 1}\right)$.

(c) Étudier la nature des points critiques de f .

3. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$: $u_n u_{n+2} - u_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$.

4. (a) Recopier et compléter la fonction Python suivante afin que, prenant en argument un entier $n \geq 2$, elle calcule et renvoie la valeur du terme u_n de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.

Python

```
def suite(n):
    v = 0
    w = 1
    for k in range(2, n + 1):
        .....
        .....
        .....
    u = .....
    return u
```

(b) Justifier qu'il existe des réels λ et μ , que l'on déterminera, tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda \varphi^n + \mu \left(\frac{-1}{\varphi} \right)^n.$$

(c) En déduire que la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)_{n \geq 1}$ converge et déterminer sa limite.

5. On considère pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{u_k u_{k+1}}.$$

(a) Montrer, sans chercher à calculer de somme, que la série de terme général $\frac{1}{u_n u_{n+1}}$ converge.

(b) En déduire que la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ converge.

(c) En utilisant le résultat de la question 3, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_{n+1} - S_n = \frac{u_n}{u_{n+1}} - \frac{u_{n+1}}{u_{n+2}}.$$

(d) Montrer que :

$$\varphi = 1 - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{u_k u_{k+1}}.$$

PROBLÈME

Toutes les variables aléatoires dans ce problème sont supposées définies sur un même espace probabilisé noté $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Partie 1 - Variables vérifiant une relation de Panjer

On dit qu'une variable aléatoire N , à valeurs dans $\mathbb{N}$, vérifie une relation de Panjer s'il existe un réel $a < 1$ et un réel b tels que :

$$P(N = 0) \neq 1 \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, P(N = k) = \left(a + \frac{b}{k}\right) P(N = k - 1).$$

1. On suppose dans cette question que $a = 0$, et que b est un réel strictement positif.

(a) Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(N = k) = \frac{b^k}{k!} P(N = 0).$$

(b) Calculer

$$\sum_{k=0}^{+\infty} P(N = k).$$

En déduire que N suit une loi de Poisson de paramètre b . Préciser son espérance et sa variance.

2. On suppose dans cette question que $a < 0$ et que $b = -2a$.

(a) Montrer que :

$$\forall k \geq 2, P(N = k) = 0.$$

(b) En déduire que N suit une loi de Bernoulli dont on précisera le paramètre en fonction de a .

3. On suppose dans cette question que Z suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

(a) Montrer que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(Z = k) = \frac{p}{1-p} \times \frac{n-k+1}{k} \times P(Z = k-1).$$

(b) En déduire que Z vérifie une relation de Panjer en précisant les valeurs de a et b correspondantes en fonction de n et p .

4. On revient dans cette question au cas général : a est un réel vérifiant $a < 1$, b est un réel, et on suppose que N est une variable aléatoire, à valeurs dans $\mathbb{N}$, vérifiant la relation de Panjer.

(a) Calculer $P(N = 1)$. En déduire que $a + b \geq 0$.

(b) Montrer que pour tout entier $m \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^m kP(N = k) = a \sum_{k=0}^{m-1} (k+1)P(N = k) + b \sum_{k=0}^{m-1} P(N = k).$$

(c) En déduire que

$$\left((1-a) \sum_{k=1}^m kP(N=k) \right)_{m \geq 1}$$

est majorée, puis que N admet une espérance. Préciser alors la valeur de $E(N)$ en fonction de a et b .

(d) Montrer que N admet un moment d'ordre 2 et que :

$$E(N^2) = \frac{(a+b)(a+b+1)}{(1-a)^2}.$$

(e) En déduire que N admet une variance et préciser la valeur de $V(N)$ en fonction de a et b .

(f) Montrer que $E(N) = V(N)$ si et seulement si N suit une loi de Poisson.

Partie 2 - Fonction génératrice

On notera dans la suite :

$$\forall k \in \mathbb{N}, p_k = P(N = k),$$

où N est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

5. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0, 1]$, la série

$$\sum_{k \geq 0} p_k x^k$$

est convergente.

On appelle alors fonction génératrice de N la fonction G définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad G(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k x^k = \sum_{k=0}^{+\infty} P(N = k) x^k,$$

et on suppose dans cette partie que N vérifie une relation de Panjer avec $0 < a < 1$ et que $\frac{b}{a} > 0$. On pose : $\alpha = \frac{-(a+b)}{a}$.

On note enfin f la fonction définie par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = p_0(1 - ax)^\alpha.$$

6. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in [0, 1], \quad f^{(k)}(x) = k! \times p_k(1 - ax)^{\alpha-k}.$$

7. Soit $x \in [0, 1]$.

(a) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n p_k x^k + (n+1)p_{n+1} \int_0^x (1 - at)^{\alpha-n-1} (x-t)^n dt.$$

(b) Vérifier que pour tout $t \in [0, x]$, $\frac{x-t}{1-at} \leq 1$ puis montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq \int_0^x (1 - at)^{\alpha-n-1} (x-t)^n dt \leq \int_0^x (1 - at)^{\alpha-1} dt.$$

(c) En déduire que :

$$G(x) = p_0(1 - ax)^\alpha.$$

En calculant $G(1)$, exprimer p_0 en fonction de a , b et α , et vérifier que $G'(1) = E(N)$.

Partie 3 - Formule de récursivité

On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires de même loi, à valeurs dans $\mathbb{N}$, mutuellement indépendantes et indépendantes de la variable N étudiée dans la question 4 de la partie 1.

On considère alors la variable aléatoire S définie par :

$$S = 0 \text{ si } N = 0 \quad \text{et} \quad S = \sum_{k=1}^N X_k \text{ si } N \geq 1,$$

autrement dit :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad S(\omega) = 0 \text{ si } N(\omega) = 0 \quad \text{et} \quad S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega) \text{ sinon.}$$

9. Calculer $P(S = 0)$ lorsque $a \in]0, 1[$ à l'aide de la partie 2.

10. (a) Calculer $P(S = 0)$ lorsque N suit une loi de Poisson de paramètre λ .

(b) On considère la fonction Python suivante, où n est un paramètre dont dépend la loi commune des X_k :

Python

```
import numpy as np
```

```
def simulX(n):
```

```
y = 0
for i in range(n):
    if np.random.random() < 1/2:
        y = y + 1
return y
```

Quelle loi de probabilité est simulée par la fonction `simulX`? Préciser ses paramètres.

- (c) On rappelle qu'en Python, après l'instruction `import numpy as np`, la commande `np.random.poisson(lam)` renvoie une réalisation d'une loi de Poisson de paramètre `lam` (le mot `lambda` étant réservé en Python, le paramètre est noté `lam`).

On suppose que N suit une loi de Poisson de paramètre λ , et que la loi des variables X_k est celle simulée à la question précédente par la fonction `simulX`.

Recopier et compléter la fonction Python suivante, afin qu'elle renvoie une simulation de la variable aléatoire S :

Python

```
def simulS(lam, n):
    N = np.random.poisson(lam)
    .....
    .....
    .....
    .....
```

11. Dans la suite du problème, on revient au cas général où N vérifie la relation de Panjer. On note toujours :

$$\forall k \geq 0, p_k = P(N = k)$$

et on notera également :

$$\forall k \geq 0, q_k = P(X_1 = k).$$

Enfin, on considère pour tout entier $n \geq 1$, la variable aléatoire

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

en convenant qu'on a $S_0 = 0$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels que $P(S_{n+1} = k) \neq 0$. Montrer que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, \quad E(X_i | S_{n+1} = k) = \frac{k}{n+1}.$$

Indication : on pourra considérer la somme

$$\sum_{i=1}^{n+1} E(X_i | S_{n+1} = k).$$

(b) Avec les mêmes hypothèses sur n et k , justifier que :

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \quad P_{[S_{n+1}=k]}(X_{n+1} = j) P(S_{n+1} = k) = q_j P(S_n = k - j).$$

(c) Dédurre des deux questions précédentes que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$ (on traitera à part le cas où $P(S_{n+1} = k) = 0$) :

$$\sum_{j=0}^k \left(a + \frac{bj}{k}\right) q_j P(S_n = k - j) = \left(a + \frac{b}{n+1}\right) P(S_{n+1} = k).$$

12. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que :

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \quad P(S = k - j) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n P(S_n = k - j).$$

(b) Montrer que :

$$\sum_{j=0}^k \left(a + \frac{bj}{k} \right) q_j P(S = k - j) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_{n+1} P(S_{n+1} = k).$$

(c) Justifier que :

$$P(S = k) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_{n+1} P(S_{n+1} = k).$$

(d) En déduire finalement que :

$$P(S = k) = \frac{1}{1 - aq_0} \sum_{j=1}^k \left(a + \frac{bj}{k} \right) q_j P(S = k - j).$$